BLEPHAROPLASTIE SUPERIEURE

Indication : Dermatochalazis (excès cutané) et parfois poche graisseuse interne
Cicatrices : Dans le pli de la paupière



Détail de l'intervention

-**Anesthésie locale**
-**Durée de l'intervention** : 30 minutes
-**Durée d'hospitalisation** : Ambulatoire
-**Durée convalescence et de soins** : 7 à 10 jours
-**Reprise des activités sportives et sexuelles :** 2 semaines
-**Soins** : Consultation avec le chirurgien 5 jours après pour l'ablation des fils
Douche quotidienne
Pas de pansement

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Uniquement en cas d'amputation du champ visuel confirmé par un examen ophtalmologique

Gestes pouvant êtres associés :

Blépharoplastie inférieure, lifting facial.

A faire avant l'intervention :

Arrêt tabac (3semaines avant), aspirine, AINS

Résultats : Cicatrisation en 5 à 10 jours

Ecchymoses péri-orbitaires 10 jours
2ème temps et retouches possibles à distance

Professeur David Boccara - Chirurgien Esthétique
Hôpital Saint-Louis - 1 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
06. 50. 86. 02. 29
secretariatprboccara@hotmail.com