LIFTING DE CUISSES

Indication : Relâchement cutané cuisses (exérèse de peau et de graisse)
Cicatrices Cicatrices dans le pli de l'aine et selon les cas jusqu'à la face interne du genou







Détail de l'intervention

- **Anesthésie générale**
-**Durée de l'intervention** : 1h30 à 2h30 selon les cas
-**Durée d'hospitalisation** : 48 à 72 heures
-**Durée convalescence et de soins** : 15 à 21 jours
-**Reprise** des activités sportives et sexuelles : 4 à 6 semaines
-**Soins** : Consultation avec le chirurgien 1 à 2 fois par semaine
Douche, injection d'anticoagulants et pansements quotidiens
Infirmière à domicile si besoin
Pas de port de vêtement compressif

Principaux risques spécifiques

Thrombo-emboliques (phlébites, embolie pulmonaire…), cicatrices, lymphorée, hématome, nécrose, infection, asymétrie …

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Possible si le relâchement cutané est conséquent
Envoi d'une entente préalable à la sécurité sociale
Décision donnée par le médecin conseil de l'Assurance Maladie
En cas de prise en charge par la sécurité sociale : frais d'hospitalisation pris en charge, possibilité d'arrêt de travail, prise en charge des soins infirmiers, possibilité de remboursement par mutuelle si honoraires chirurgicaux

Gestes pouvant êtres associés : Lipoaspiration

A faire avant l'intervention : bilan sanguin, consultation d'anesthésie

Arrêt tabac (3semaines avant), aspirine, AINS

Résultats : cicatrisation en 21jours

Œdème 3 à 6 mois
Aspect cicatrice 18 à 24 mois
Sensibilité peut être altérée, définitive après 24 mois.
2ème temps et retouches possibles à distance

Professeur David Boccara - Chirurgien Esthétique
Hôpital Saint-Louis - 1 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
06. 50. 86. 02. 29
secretariatprboccara@hotmail.com