LIPOASPIRATION

Indication : Aspiration de surcharges graisseuses localisées
Cicatrices : Millimétriques en regard des zones à aspirer


zones habituelles de liposuccion

Détail de l'intervention

-**Anesthésie générale** ou locale selon le nombre de zones et la quantité à aspirer
-**Durée de l'intervention** : 00h30 à 1h30 selon les cas
-**Durée d'hospitalisation** : Ambulatoire à 24 heures
-**Durée convalescence et de soins** : 3 à 7 jours
-**Reprise des activités sportives et sexuelles :** 1 à 4 semaines
-**Soins** : Consultation avec le chirurgien à J15
Douche et pansements quotidiens
Injection d'anticoagulants par voie sous cutanée 7 à 15J
Infirmière à domicile si besoin
Port d'une gaine de contention durant 2 semaines selon les cas

Principaux risques

Phlébite.

Prise en charge par l'Assurance Maladie

Uniquement en cas de lipodystrophie médicamenteuse associée (anti-rétroviraux…)

Gestes pouvant êtres associés :

Greffe adipocytaire

A faire avant l'intervention :

bilan sanguin, consultation d'anesthésie, arrêt tabac (3semaines avant), aspirine, AINS

Résultats : Cicatrisation en 10 jours

Aspect cicatrice 18 à 24 mois
Résorbtion œdème et aspect définitif 6 mois

Professeur David Boccara - Chirurgien Esthétique
Hôpital Saint-Louis - 1 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
06. 50. 86. 02. 29
secretariatprboccara@hotmail.com