
# **AUGMENTATION MAMMAIRE PAR LIPOSCULTURE**

**Indication**: Augmentation du volume mammaire, correction d'une asymétrie, d'une malformation (sein tubéreux)

Cicatrices : Millimétriques en regard des zones à aspirer et punctiformes en regard des zones à injecter





#### Détail de l'intervention

- -Anesthésie générale ou locale selon le nombre de zones et la quantité à aspirer et injecter
- -Durée de l'intervention : 00h30 à 2h30 selon les cas
- -Durée d'hospitalisation : Ambulatoire à 24 heures
- -Durée convalescence et de soins : 7 à 14 jours
- -Reprise des activités sportives et sexuelles : 1 à 4 semaines
- -Soins: Consultation avec le chirurgien à 115

Douche et pansements quotidiens

Injection d'anticoagulants par voie sous cutanée 7 à 15J

Infirmière à domicile si besoin

Port d'une gaine de contention durant 2 semaines selon les cas

## Principaux risques

Phlébite.

### Prise en charge par l'Assurance Maladie

En cas d'agénésie mammaire inférieure à un bonnet A, Asymétrie de plus d'un bonnet de soutien-gorge

#### A faire avant l'intervention :

Bilan sanguin, consultation d'anesthésie, arrêt tabac (3semaines avant), aspirine, AINS

Résultats: Cicatrisation en 10 jours

Aspect cicatrice 18 à 24 mois

Résorbtion (20 à 40%) œdème et aspect définitif à 6 mois



